

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENT·E·S

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

P^rVELTASSA^{MD}

Poudre de patiromer pour suspension, voie orale

Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre **VELTASSA** et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Discutez de votre état de santé et de votre traitement avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **VELTASSA**.

Pourquoi utilise-t-on VELTASSA?

VELTASSA est utilisé pour traiter les taux élevés de potassium dans le sang chez l'adulte. VELTASSA est conçu uniquement pour une utilisation chez les patients atteints de néphropathie chronique, à l'exception de la néphropathie au stade terminal.

Comment VELTASSA agit-il?

VELTASSA se fixe au potassium dans l'intestin pour que moins de potassium soit absorbé dans votre sang. VELTASSA commence à agir après un délai de quatre à sept heures.

Quels sont les ingrédients de VELTASSA?

Ingrédient médicamenteux : patiromer sous forme de calcium de sorbitex de patiromer. Cet ingrédient médicamenteux contient du sorbitol et du calcium. La teneur en sorbitol est d'environ 4 g (10,4 kcal) pour 8,4 g de patiromer.

Ingrédient non médicamenteux : gomme xanthane

VELTASSA se présente sous la ou les formes pharmaceutiques suivantes :

Poudre pour suspension orale en sachets contenant 8,4 g, 16,8 g ou 25,2 g de patiromer (sous forme de calcium de sorbitex de patiromer).

N'utilisez pas VELTASSA dans les cas suivants :

- vous êtes allergique au patiromer ou à tout autre ingrédient de VELTASSA;
- vous souffrez d'intolérance au fructose, car VELTASSA contient du sorbitol.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser VELTASSA, afin d'assurer l'utilisation adéquate du médicament et d'aider à éviter les effets secondaires. Informez votre professionnel de la santé de votre état actuel et de vos problèmes de santé, notamment si vous :

- avez de la difficulté à avaler;

- avez des problèmes gastro-intestinaux graves;
- avez subi une intervention chirurgicale importante à l'estomac ou aux intestins;
- êtes enceinte, allaitez, pensez être enceinte ou envisagez de tomber enceinte. On ignore si VELTASSA peut nuire au fœtus pendant votre grossesse ou pour votre nourrisson allaitant;
- savez que vous avez un taux élevé de calcium dans le sang ou prenez des suppléments de calcium.

Autres mises en garde :

- Un faible taux de magnésium dans le sang peut être observé avec VELTASSA. Votre professionnel de la santé surveillera votre taux de magnésium pendant au moins le premier mois de traitement par VELTASSA et pourra vous prescrire un supplément de magnésium.
- Votre professionnel de la santé surveillera peut-être vos concentrations de potassium pendant votre traitement par VELTASSA. Si la baisse de vos concentrations de potassium est trop forte, votre dose de VELTASSA pourrait être diminuée ou vous pourriez devoir arrêter de prendre VELTASSA.
- N'arrêtez pas de prendre VELTASSA sans l'approbation de votre professionnel de la santé, car votre taux de potassium dans le sang pourrait augmenter.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine douce.

Les produits suivants pourraient interagir avec VELTASSA :

- le telmisartan, le bisoprolol, le carvedilol ou le nébivolol, utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et certains problèmes cardiaques;
- la ciprofloxacine, utilisée pour traiter les infections bactériennes;
- la lévothyroxine, utilisée pour traiter une glande thyroïde pas assez active;
- la metformine, utilisée pour traiter le diabète;
- le mofétilmycophénolate, utilisé pour affaiblir le système immunitaire;
- la quinidine, utilisée pour traiter les anomalies du rythme cardiaque;
- la thiamine (vitamine B1).

Si vous prenez d'autres médicaments par voie orale (par la bouche), dites-le à votre professionnel de la santé. Il vous expliquera comment les prendre durant votre traitement par VELTASSA. Certains médicaments par voie orale doivent être pris au moins 3 heures avant ou 3 heures après VELTASSA. Votre professionnel de la santé vous dira s'il est nécessaire de procéder ainsi avec les médicaments par voie orale que vous prenez actuellement.

Comment utiliser VELTASSA?

Prenez toujours ce médicament en suivant exactement les conseils de votre professionnel de la santé. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez des doutes.

Combinez VELTASSA avec de l'eau ou d'autres liquides ou aliments mous énumérés plus loin dans cette section. Ensuite mélangez bien, comme suit :

- Versez environ 40 mL (3 cuillères à soupe) d'eau dans un verre.
- Ajoutez le nombre requis de sachets de VELTASSA et mélangez.
- Ajoutez encore environ 40 mL (3 cuillères à soupe) d'eau et mélangez bien. La poudre ne se dissout pas, mais forme une suspension.
- Vous pouvez ajouter plus d'eau au mélange pour vous aider à avaler le médicament.
- Buvez le mélange dans l'heure suivant la préparation et conservez-le à température ambiante. S'il reste de la poudre dans le verre après l'administration, ajoutez plus d'eau, mélangez la suspension et buvez-la immédiatement. Il se peut que vous deviez recommencer pour vous assurer d'avoir bu toute la poudre.

Vous pouvez utiliser les liquides ou aliments mous suivants plutôt que de l'eau : jus de pomme, de canneberge, d'ananas, d'orange, de raisin ou de poire, nectar d'abricot ou de pêche, yogourt, lait, épaississant (féculé de maïs, par exemple) dans un liquide ou un aliment mou, compote de pommes, pouding à la vanille ou au chocolat. Il ne faut pas utiliser d'autres liquides ou aliments mous, puisqu'ils pourraient contenir de grandes quantités de potassium.

Pensez à tenir compte du potassium contenu dans les liquides ou les aliments mous utilisés pour préparer VELTASSA.

Buvez la suspension de VELTASSA préparée préférablement à la même heure chaque jour, avec ou sans nourriture. Ne chauffez jamais VELTASSA et ne l'ajoutez pas à des aliments ou à des liquides chauds.

Ne prenez pas VELTASSA sous forme de poudre sèche.

Dose habituelle :

- Dose de départ : 8,4 g de patiromer (le contenu d'un sachet de 8,4 g) une fois par jour
- Dose maximale : 25,2 g de patiromer une fois par jour

Votre professionnel de la santé peut ajuster la dose selon le taux de potassium dans votre sang.

Prenez VELTASSA au moins trois heures avant ou après d'autres médicaments par voie orale, à moins d'un autre conseil de votre professionnel de la santé.

Surdose :

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop de VELTASSA, arrêtez de prendre VELTASSA et contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous oubliez une dose de VELTASSA, prenez-la dès que vous y pensez le jour même. Cependant, s'il est presque l'heure de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez avec votre prochaine dose prévue. Retournez à l'horaire de dosage normal. Ne prenez pas deux doses à la fois. Si vous oubliez plusieurs doses, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à VELTASSA?

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez VELTASSA. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

La plupart des effets secondaires de VELTASSA se produisent dans les quatre premières semaines du traitement.

- Les effets secondaires courants (jusqu'à une personne sur dix) incluent la constipation, la diarrhée, les douleurs abdominales, de faibles taux de potassium ou de magnésium dans le sang et les flatulences.
- Les effets secondaires peu fréquents (jusqu'à une personne sur cent) incluent :
 - ballonnements, indigestion, inconfort dans la partie supérieure de l'abdomen, reflux gastrique, nausées et vomissements;
 - réactions allergiques, comme l'enflure;
 - anorexie;
 - crampes musculaires;
 - altération du goût;
 - démangeaisons;
 - faibles taux de fer et de phosphore dans le sang;
 - faible tension artérielle.

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant qui n'a pas été mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en :

- visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou
- téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation :

- Conserver VELTASSA au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C), à moins que votre professionnel de la santé vous indique de le conserver à la température ambiante (entre 15 et 25 °C).
- S'il est conservé à la température ambiante (15 °C à 25 °C), VELTASSA ne doit pas être utilisé après la date d'élimination inscrite sur l'emballage par le professionnel de la santé. Si aucune date d'élimination ne figure sur l'emballage, consultez votre professionnel de la santé puisque cette date survient généralement avant la date de péremption du produit.

- Ne pas exposer VELTASSA à une température dépassant 40 °C.
- Garder hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne pas jeter de médicaments dans les eaux usées ni dans les ordures ménagères.
Vous pouvez demander à un professionnel de la santé comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à la protection de l'environnement.

Pour en savoir plus sur VELTASSA :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Lisez la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant (www.otsukacanada.com), ou peut être obtenu en téléphonant au 1-877-341-9245.

Le présent dépliant a été rédigé par Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd.

Dernière révision 05 AVR 2024.